



УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ

- Посещение леса**
 - Клещ сидит на травинках или деревьях.
 - Не может летать или прыгать.
 - Может цепляться за жертву.
 - Может упасть на неё.
- Занесение клещей животными** собаками и кошками после прогулки.
- Занесение клещей людьми** на одежду, с цветами, ветками.



СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ



- Укус клеша.
- Раздавливание и втирание присосавшегося клеша.
- Употребление в пищу инфицированного сырого козьего и коровьего молока.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Носите в лесу специальную одежду**
 - Куртку или рубашку с длинным рукавом, с плотно застегнутыми воротом и манжетами.
 - Головной убор.
 - Высокую закрытую обувь, в которую можно заправить штаны.
- Используйте репелленты** обрабатывайте одежду и открытые участки тела специальными защитными препаратами.
- Осматривайте себя** не пренебрегайте само и взаимоосмотрами на привалах и по возвращению домой.
- Пейте кипяченое молоко**
- Сделайте прививку против клещевого энцефалита!**



КЛЕШЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

ЧТО ТАКОЕ ЭНЦЕФАЛИТ?

Энцефалит – вирусное природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Источниками вируса являются более 100 видов животных – крупный рогатый скот, птицы, грызуны и др.

ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА



размер
в зависимости от вида
3-25 мм

Среда обитания:

в лесах, на полянах, в парках и других местах, где имеется трава и кусты.

Активность:

теплое время года, с апреля по октябрь, пик активности – июнь-июль.

Как нападает:

Клещ незаметно впивается в кожу жертвы, выделяет со слюной анестезирующую и разжижающую кровь вещество, обезболивающее процесс присасывания. Человек может длительное время не ощущать прикрепившегося клеша.

Через несколько часов после укуса голова насекомого полностью погружается под кожу человека, а брюшко раздувается от выпитой крови.



3-4 МГ



40-500 МГ

Вирус сохраняется в течение всей жизни клеша!



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Инкубационный период** длится 1,5 - 2 недели.
- Поражение коры головного мозга** длится несколько дней.
- Воспаление мозга**
Симптомы: головные боли, рвота, потеря сознания (вплоть до комы), температура тела 39-40°.



ПЕРВАЯ ПОМОШЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕША

- Используйте нить для извлечения клеша** Прочную нитку завязать в узел как можно ближе к хоботку клеша, затем извлечь клеша, медленно раскачивая и подтягивая его вверх.
- Если на коже осталась черная точка** Во время извлечения клеша оторвалась его головка или хоботок. Обработайте место укуса спиртом или 5% раствором йода и, затем, удалите головку стерильной иглой (предварительно прокаленный на огне) также, как удаляете обычную занозу.
- Продезинфицируйте место укуса** Как можно быстрее обработайте место укуса клеша любым дезинфицирующим средством – 3-5% раствором зеленки, 5% раствором йода, спиртом и.т.п.
- Тщательно вымойте руки с мылом**
- Обратитесь к врачу** Клеща необходимо исследовать на наличие инфекции. Поместите клеша в стеклянный флакон вместе с слегка намоченным кусочком ваты, плотно закройте крышкой. Храните в холодильнике не более 2 суток.

✓ Брать клеша голыми пальцами, раздавливать! **Что делать нельзя!**
 ✓ Делать резкие движения – клеш разорвется!
 ✓ Использовать масло – оно закупорит дыхательные отверстия, и клеш может умереть, так и оставшись в коже!